



## Chorão

**Nome comum:** Bálsamo; Chorão-das-praias

**Nome científico:** *Carpobrotus edulis* (L.) N. E. Br.

**Família:** *Aizoaceae*

**Origem:** África do Sul

**Introdução na Ilha da Madeira:** Introduzida por volta de 1825 (Lowe, 1864).

**Descrição:** Herbácea de caules longos e prostrados, 1-3 m de altura, as ramificações podem surgir de todos os nós, formando densos tapetes. Folhas opostas, suculentas, limbo verde brilhante, de secção triangular. Flores solitárias e grandes, 5-9 cm de diâmetro. Pseudobagas globosas a ovóides, deiscentes, tornando-se púrpuras na maturação, permanecendo na planta durante muitos meses. Floração entre maio e julho.

**Ambientes preferenciais para invasão:** Espécie bem adaptada a ecossistemas litorais. Prefere sistemas dunares, mas adapta-se bem a áreas rochosas e penhascos perto de zonas costeiras. São muito resistentes à seca, ao vento e às exposições marítimas.

**Áreas de ocorrência na Ilha da Madeira:** Ocorre desde o litoral até 500 m de altitude, apresentando uma grande expressão na Ponta de São Lourenço.

**Impactes no ambiente:** Esta planta, além de formar extensos tapetes que dificultam ou impedem o desenvolvimento de plantas nativas, aumenta a acidez do solo e modifica a morfologia do sistema radicular de algumas plantas.

**Curiosidades:** Aumenta a acidez do solo e modifica a morfologia do sistema radicular de algumas plantas.

**Bibliografia:** Marchante, H.; Marchante, E. e Freitas, H. 2005. *Plantas invasoras em Portugal – Fichas para identificação e controlo. Ed dos autores.* Coimbra.

Vieira, R. 2002. Flora da Madeira, *Plantas Vasculares Naturalizadas no Arquipélago da Madeira.* Museu Municipal do Funchal, supl. Nº 8, Câmara Municipal do Funchal. Funchal.