



Maracujá-banana

Nome comum: Maracujá-banana

Nome científico: *Passiflora mollissima* (H B K.) Bailey

Família: *Passifloraceae*

Origem: América central

Introdução na Ilha da Madeira: Referida por Menezes em 1914 sob o binome de *Tacsonia molissima* HBK.

Descrição: Planta trepadora, podendo atingir até 10 m de comprimento, de caules roliços. Folhas alternas, 10-15 cm, lóbulos oblongo-lanceolados, levemente pubescentes na página superior e densamente pubescentes na inferior, pecíolos 1-7 cm de comprimento. Flores rosadas solitárias, 7-10 cm de diâmetro. Fruto amarelo-alaranjado, baga 5 cm, ovóide a subglobosa. Cada fruto contém 50-200 sementes. Floração durante todo o ano, principalmente entre julho e outubro.

Ambientes preferenciais para invasão: Prefere ambientes húmidos e temperados. É frequente observá-la em terrenos agrícolas abandonados e dentro da floresta, principalmente em zonas de clareiras.

Áreas de ocorrência na Ilha da Madeira: Ocorre desde o litoral até aos 700 m de altitude.

Impactes no ambiente: Como é uma planta trepadeira acaba por cobrir toda a vegetação à sua volta, acabando por lhes causar a morte.

Curiosidades: O período de vida desta espécie pode exceder os 20 anos. Cada fruto contém entre 50-200 sementes.

Bibliografia: Vieira, R. 2002. *Flora da Madeira, Plantas Vasculares Naturalizadas no Arquipélago da Madeira*. Museu Municipal do Funchal, supl. Nº 8, Câmara Municipal do Funchal. Funchal.

Ferreira, L. 2004. *Contribuição para o levantamento e caracterização das áreas invadidas pelo *Pittosporum undulatum* Vent. (*Pittosporaceae*) e *Passiflora mollissima* (Kunth) L. H. Bailey (*Passifloraceae*) na ilha da Madeira*. Estágio científico, Universidade da Madeira. Funchal.