



Avoadeira

Nome comum: Avoadeira

Nome científico: *Conyza bonariensis* L. Cronq.

Família: Asteraceae

Origem: América Central e do Sul

Introdução na Ilha da Madeira: Está perfeitamente naturalizada na Madeira, desde os tempos de LOWE (1868).

Descrição: Terófito até 60 cm, de caule revestido de pelos curtos e setíferos. Caule primário simples com panícula terminal, posteriormente com ramagem comprida que ultrapassa o eixo primário. Folhas acinentadas, as inferiores com dimensões compreendidas entre $5,8 \times 0,5 - 1$ cm, ablancoadas, inteiras ou com 2-5 lobos ou dentes grosseiros de cada lado. As folhas distais com $1-3 \times 0,2-0,3$ cm, linear-oblongas, inteiras e sesséis. Flores reunidas em capítulos abertos com 8-15mm de diâmetro. Cipselas com 1,25-1,5mm, esparsamente pubescentes, papilho com 4-5 mm, branco-sujo. A floração ocorre entre abril e novembro.

Ambientes preferenciais para invasão: Invade essencialmente locais abertos. Surge sobretudo em áreas incultas e perturbadas junto a áreas urbanas, beiras de estrada e caminhos.

Áreas de ocorrência na Ilha da Madeira: Está naturalizada em vários locais da Ilha, desde o nível do mar até aos 600 m de altitude.

Impactes no ambiente: Suprime a proliferação e o desenvolvimento das plantas nativas. Depois de estabelecida é muito difícil a sua erradicação.

Curiosidades: Produz um elevado número de sementes, que são eficientemente dispersas pelo vento.

Bibliografia: Marchante, H., Marchante, E. e Freitas, H. 2005. *Plantas invasoras em Portugal – Fichas para identificação e controlo*. Ed dos autores. Coimbra.

Press, J. R., Short, M. J. 1994. *Flora of Madeira*. The Natural History Museum (HMSO). Lond.

Vieira, R. 2002. *Flora da Madeira, Plantas Vasculares Naturalizadas no Arquipélago da Madeira*. Museu Municipal do Funchal, supl. Nº 8, Câmara Municipal do Funchal. Funchal.